



Beleid bij dreiging van 10% gewichtsverlies

Uitgangspunt is om te voorkomen dat de baby 10% of meer afvalt en bij dreiging van 10% gewichtsverlies tijdig in te grijpen zodat bijvoeden met kunstvoeding voorkomen kan worden. Eerste voorwaarde moet zijn dat de baby vaak genoeg is aangelegd in de eerste 2 dagen. Is dit niet het geval, dan dient er direct gestart te worden met kolven. Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt ook geïnventariseerd of de baby regelmatig heeft aangelegd en goed heeft gedronken. Hieronder maken we onderscheid tussen 7 % afvallen en 10 % afvallen, omdat dit in de praktijk het meest werkzaam is.

Bij 7 % afvallen:

Heeft de baby de eerste dagen 8-12 keer per 24 uur aangelegd met de juiste techniek?
Zijn de voedingen normaal qua duur (10-30 minuten per borst)?
Is de baby tevreden na het drinken?
Lijkt de voeding goed op gang te komen?
Voelt de moeder verschil tussen de borsten voor en na de voeding?

Wanneer alle vragen met ja zijn beantwoord, is er op dit moment geen reden tot ongerustheid. Veel kinderen vallen de eerste dagen af om hierna weer gestaag aan te komen rond dag 4-5.

Wel wordt met de kraamverzorgster afgesproken contact met ons op te nemen wanneer:

- De baby de volgende dag verder is afgevallen. Wanneer hier sprake van is en het lijkt er op dat het afvallen richting de 10% neigt, dan wordt gestart met kolven na iedere voeding (overdag) en deze voeding wordt d.m.v. cupfeeding of met een spuitje aan de baby aangeboden nadat hij aan de borst heeft gedronken.
- De baby de volgende dag minder goed drinkt aan de borst en minder tevreden is na de voeding. Het advies zal gegeven worden de baby vaker aan te leggen of eventueel extra te kolven en deze voeding bij te geven d.m.v. cupfeeding of met een spuitje.

Wanneer 1 of meerdere vragen met nee wordt beantwoord, wordt direct geadviseerd te starten met kolven en deze gekolfde melk na te geven na iedere voeding.

Bij 10 % afvallen

Wanneer sprake is van een gewichtsverlies van 10 % of meer, zullen we altijd contact opnemen met de dienstdoende kinderarts. Wanneer de kraamvrouw nog niet gekolfd heeft en er nog geen extra voeding aan de baby is aangeboden, zullen we ervoor pleiten (indien dit verantwoord is) om de baby nog 24 uur thuis te mogen houden, mits na iedere voeding of gekolfde melk wordt bijgegeven of gestart wordt met het geven van kunstvoeding middels cupfeeding of met een spuitje. Het liefst wordt alleen gekolfde melk aangeboden, maar bij te weinig opbrengst zal tijdelijk gebruik van kunstvoeding gemaakt moeten worden. Afhankelijk van het advies van de kinderarts en welke dag na de bevalling het is, wordt de hoeveelheid bijvoeding die na iedere voeding wordt gegeven afgesproken. Belangrijk hierbij is dat aan de ouders goed uitgelegd wordt wat er precies aan de hand is en dat de genomen maatregelen voor maximaal 48 uur gelden. Hierna zal besloten moeten worden hoe nu verder. Bovenstaande wordt altijd in overleg met de ouders afgesproken. Het afbouwen van de bijvoeding zal bij aankomen van de baby geleidelijk gebeuren.

Wij gaan er vanuit dat de baby met deze adviezen na 24 uur gegroeid zal zijn. Is dit niet het geval, dan wordt de kinderarts opnieuw geconsulteerd evenals een lactatiekundige.

Wanneer de kraamvrouw al aan het kolven was en deze melk al werd aangeboden aan de baby en deze ondanks dit beleid toch verder afgevallen is, dan zullen wij alert zijn op eventuele pathologie en de baby insturen voor opname.

Versie september 2012

Praktijkadres

Lindonk 153
4761 NG Zevenbergen

Tel. 0168-324152
Fax. 0168-324103

Bereikbaarheid

Mobiel 06-22013323
Semafoon 06-65150595